

レジメン番号	レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コースの日数	催吐リスク	備考
C18-1	大腸がんsLV5FU2	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14日	軽度	
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-2	大腸がんFOLFIRI	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14日	中等度	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-3	大腸がんmFOLFOX6	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14日	中等度	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-4	大腸がんBEV + FOLFIRI	ペバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1	14日	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-5	大腸がんBEV + mFOLFOX6	ペバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1	14日	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-8	大腸がんCET	セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	120分	初回 Day1	7日	最小度	
			250 mg/m ²		60分	2回目以降 Day1			
C18-9	大腸がんCET + CPT-11 (CET毎週投与)	セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	120分	初回 Day1	14日	中等度	
			250 mg/m ²		60分	2回目以降 Day1,8			
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
C18-10	大腸がんCPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1	14日	中等度	
C18-11	大腸がんBEV + sLV5FU2	ペバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1	14日	軽度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-12	大腸がんCapeOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		カベシタピン	2000 mg/m ² /day	内服 朝・夕食後		Day1-14			
C18-13	大腸がんBEV + CapeOX	ペバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		カベシタピン	2000 mg/m ² /day	内服 朝・夕食後		Day1-14			
C18-16	大腸がんPANI	バニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14日	最小度	
C18-17	大腸がんPANI + FOLFIRI	バニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14日	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-18	大腸がんPANI + mFOLFOX6	バニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14日	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
C18-20	大腸がんSIRB	ペバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1	21日	中等度	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
		S-1	80 mg/m ² /day	内服 朝・夕食後		Day1-14			
C18-21	大腸がんBEV + SOX	ペバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		S-1	80 mg/m ² /day	内服 朝・夕食後		Day1-14			
C18-22	大腸がんPANI + CPT-11	バニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14日	中等度	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			

C18-23	大腸癌がんCET + FOLFIRI (CET毎週投与)	セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	120分	初回 Day1	14日	中等度	
			250 mg/m ²		60分	2回目以降 Day1,8			
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-24	大腸癌がんCET + mFOLFOX6 (CET毎週投与)	セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	120分	初回 Day1	14日	中等度	
			250 mg/m ²		60分	2回目以降 Day1,8			
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-25	大腸癌がんRAM + FOLFIRI	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	Day1	14日	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-26	大腸がんBEV + FOLFOXIRI	ベバズマブ	5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1	14日	高度	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	60分	Day1			
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		フルオロウシル	3000 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-27	大腸がんAFL + FOLFIRI	アフリベルセプト	4 mg/kg	点滴静注	60分	Day1	14日	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-28-1	大腸がんBEV + TAS-102	ベバズマブ	5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1,15	28日	中等度	
		トリフルリジン /チピラシル	70 mg/m ² /day	内服 朝・夕食後		Day1-5,8-12			
C18-28-2	大腸がんBEV + TAS-102	ベバズマブ	5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1,15	28日	中等度	
		トリフルリジン /チピラシル	70 mg/m ² /day	内服 朝・夕食後		Day1-5,15-19			
C18-31	大腸癌がん (MSI-H) NIVO + IPI	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	30分	Day1	21日	最小度	5コース以降はNIVO単独投与
		イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	30分	Day1			
C18-32	大腸癌がんCET + mFOLFOX6 (CET隔週投与)	セツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14日	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-33	大腸癌がんCET + FOLFIRI (CET隔週投与)	セツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14日	中等度	
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1			
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
		フルオロウシル	400 mg/m ²	点滴静注	5分	Day1			
		フルオロウシル	2400 mg/m ²	持続静注	46時間	Day1			
C18-34-1	大腸癌がん (BRAF変異陽性) CET + エンコラフェニブ + ビメチニブ (CET毎週投与)	セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	120分	初回 Day1	14日	中等度	CET + エンコラフェニブの2 剤併用の場合もあり
			250 mg/m ²		60分	2回目以降 Day1,8			
		エンコラフェニブ	300 mg/day	内服 朝食後		Day1-14			
		ビメチニブ	90 mg/day	内服 朝・夕食後		Day1-14			
C18-34-2	大腸癌がん (BRAF変異陽性) CET + エンコラフェニブ + ビメチニブ (CET隔週投与)	セツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1,8	14日	中等度	CET + エンコラフェニブの2 剤併用の場合もあり
		エンコラフェニブ	300 mg/day	内服 朝食後		Day1-14			
		ビメチニブ	90 mg/day	内服 朝・夕食後		Day1-14			
C18-35	大腸がんCET + CPT-11 (CET隔週投与)	セツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注	120分	Day1	14日	中等度	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	90分	Day1			
C18-36	大腸がんBEV + S-1	ベバズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1	21日	軽度	
		S-1	80 mg/m ² /day	内服 朝・夕食後		Day1-14			

C18-37	大腸がん (HER2陽性) PER+Tmab	ベルツズマブ	840 mg/body	点滴静注	60分	初回 Day1	21日	最小度	
			420 mg/body		30分	2回目以降 Day1			
		トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	90分	初回 Day1			
			6 mg/kg		30分	2回目以降 Day1			

催吐リスク 分類	高度リスク	90%を超える患者に吐き気が発現する	NK1受容体拮抗薬、5HT3拮抗薬、DEX併用
	中等度リスク	30~90%の患者に吐き気が発現する	5HT3拮抗薬、DEX併用
	軽度リスク	10~30%の患者に吐き気が発現する	DEX
	最小度リスク	吐き気が発現しても10%未満である	制吐薬なし